



جمهوری اسلامی ایران
وزارت آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
دبیرستان غیر دولتی موحّد

امتحانات
دبیرستان غیر دولتی موحّد

نام و نام خانوادگی:	امتحانات نوبت دوم	نام دبیر: آقای غلامی
پایه: یازدهم تجربی	ریاضی ۲	تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۲/۲۷
کلاس:		زمان پاسخگویی: ۸۰

شماره سؤال	سؤالات	محل مهر یا امضاء مدیر	نمره
۱	دو انتهای یکی از قطرهای دایره ای نقاط $A(۳,۶)$ و $B(-۱,۲)$ است. الف) مختصات مرکز دایره را بیابید. ب) آیا نقطه $C(۵,۴)$ روی محیط این دایره قرار دارد؟ چرا؟		۰,۵ ۰,۷۵
۲	معادله $-7x^3 = 1 - 8x^6$ را به روش تغییر متغیر حل کنید.		۰,۷۵
۳	در دوزنقه $ABCD$: $MN \parallel AB \parallel CD$ مقادیر x و y و AD و BC را بدست آورید.		۲
۴	به کمک برهان خلف ثابت کنید از یک نقطه واقع بر یک خط نمی توان دو عمود بر آن رسم کرد.		۰,۵
۵	یک به یک بودن تابع $f(x) = \frac{1}{3-x}$ را بررسی کنید و سپس ضابطه تابع وارون آن را بدست آورید.		۱
۶	اگر $f(x) = \sqrt{x+3}$ و $g(x) = \frac{3}{x-2}$ دو تابع باشند: الف) مقدار $(f-g)(1)$ را بدست آورید. ب) دامنه تابع $(f \times g)(x)$ را بدست آورید.		۱
۷	تابع $y=f(x)$ با دامنه $[-۲,۱]$ و برد $[-۳,۴]$ را در نظر بگیرید: دامنه تابع $g(x) = -۳f(۲x) + ۱$ برابر و برد آن برابر است.		۰,۵
۸	اگر $\sin 10 = 0.17$ و $\cos 10 = 0.99$ باشد، حاصل عبارت زیر را بدست آورید. $A = \sin 350^\circ + \sin 100^\circ - \cos 260^\circ - \cos 190^\circ$		۲
۹	مقدار $y = 4 \cos(2x + \frac{\pi}{2})$ را به ازای $x = \frac{\pi}{6}$ بدست آورید.		۰,۵
۱۰	نمودار تابع $y = \frac{1}{2} \sin(x + \frac{\pi}{4})$ را در بازه ای به طول ۲π رسم کنید.		۰,۵
۱۱	از معادله $\log(x-3) = 2 - \frac{1}{2} \log 25$ مقدار x را بدست آورید.		۰,۷۵
۱۲	جاهای خالی را پر کنید. الف) دامنه تابع $y = (\sqrt{3})^x$ برابر و برد آن برابر است. ب) تابع $y = \log_{0.2} x$ تابعی یک به یک و در نتیجه معکوس پذیر پ) نمودار تابع $y = (\frac{1}{6})^x$ محور عرض ها را در نقطه ای به عرض قطع می کند. ت) نمودار تابع $y = \log_5^x$ محور طول ها را در نقطه ای به طول قطع می کند.		۱,۵
۱۳	الف) معادله $(\frac{1}{25})^{3-x} = 625^{3x-1}$ را حل کنید.		۰,۷۵



جمهوری اسلامی ایران
وزارت آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
دبیرستان غیر دولتی موحّد

امتحانات
دبیرستان غیر دولتی موحّد

نام و نام خانوادگی :	امتحانات نوبت دوم	نام دبیر : آقای غلامی
پایه : یازدهم تجربی	ریاضی ۲	تاریخ امتحان : ۱۴۰۰/۲/۲۷
کلاس :		زمان پاسخگویی : ۸۰

۰,۷۵	الف) معادله $\left(\frac{1}{25}\right)^{3-x} = 625^{3x-1}$ را حل کنید. ب) نامعادله $\frac{1}{256} \leq 8^{4p-2}$ را حل کنید.	۱۳
۱,۵	حدود زیر را محاسبه کنید. الف) $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{x-3}$ ب) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos^3 x}{1 - \sin x}$ ج) $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{ 9-x^2 }{x-3}$	۱۴
۱	مقدار a را چنان بیابید که تابع $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x^2-3x+2} & x \neq 1 \\ a+2 & x=1 \end{cases}$ در نقطه $x=1$ پیوسته باشد.	۱۵
۱	الف) تابع $y = x - [x]$ را رسم کنید و سپس وضعیت پیوستگی آن را در بازه های $(0,1)$ و $(-1,0)$ بررسی کنید. ب) آیا تابع در بازه های $(0,1]$ ، $(-1,1)$ پیوسته است؟ چرا؟	۱۶
۰,۵	تاس را دو بار پرتاب کرده ایم. اگر بدانیم مجموع اعداد ظاهر شده بیشتر از ۸ است، با چه احتمالی این دو عدد با هم برابرند؟	۱۷
۱,۵	احتمال قبولی مهتاب در کنکور سراسری ۰,۸ و احتمال قبولی هیلا ۰,۷ است. الف) با چه احتمالی حداقل یکی از این دو نفر در کنکور سراسری قبول می شوند؟ ب) با چه احتمالی فقط یکی از این دو نفر در کنکور سراسری قبول می شوند؟	۱۸
۰,۵	اگر واریانس داده های ۱۰ و $\frac{C}{3}$ و $2b$ و $5a-5$ برابر صفر باشد، میانگین این داده ها را بدست آورید.	۱۹
۱	برای داده های زیر: ۱۰۰.۴۵.۸۰.۹۵.۱۰۲.۴۳.۵۲.۳۱.۱۲.۸۱.۲۵۰.۱۸.۳۵.۱۳۰.۴۲.۹۴.۸۱.۵۶ الف) دامنه تغییرات را بدست آورید. ب) تقریباً ۲۵٪ داده ها قبل از کدام عدد هستند؟ پ) تقریباً ۵۰٪ داده ها بعد از کدام عدد هستند؟ ت) تقریباً ۷۵٪ داده ها قبل از کدام عدد هستند؟	۲۰


موفق باشید.



جمهوری اسلامی ایران
وزارت آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
دبیرستان غیر دولتی موحّد

امتحانات
دبیرستان غیر دولتی موحّد

نام و نام خانوادگی :	نام دبیر : آقای غلامی
پایه : یازدهم ریاضی	تاریخ امتحان : ۱۴۰۰/۲/۲۷
کلاس :	زمان پاسخگویی : ۸۰
	کلید ریاضی ۲

ردیف	راهنمای تصحیح	محل مهر یا امضاء مدیر
۱	$x_o = \frac{(xA+yB)}{2} = \frac{3-1}{2} = 1$ $\rightarrow o(1,4)$ $y_o = \frac{(yA+yB)}{2} = \frac{6+2}{2} = 4$ $o_A = \sqrt{(3-1)^2 + (6-4)^2} = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$ $o_C = \sqrt{(5-1)^2 + (4-4)^2} = \sqrt{16} = 4$ <p>$o_C > o_A$ پس C خارج دایره است.</p>	
۲	$8x^6 - 7x^3 - 1 = 0$ $t = x^3 \rightarrow 8t^2 - 7t - 1 = 0 \xrightarrow{\text{مجموع ضرایب صفر}} t = 1 \rightarrow x = 1$ $t = \frac{-1}{8} \rightarrow x = \frac{-1}{2}$	
۳	$\Delta ABD: AB \parallel ME \Rightarrow \frac{MD}{MA} = \frac{ED}{EB} \Rightarrow \frac{x+4}{x} = \frac{10}{5} \Rightarrow x = 4$ $\Delta BDC: DC \parallel EN \Rightarrow \frac{BN}{NC} = \frac{BE}{DE} \Rightarrow \frac{5}{10} = \frac{3}{y} \Rightarrow 5y = 30 \Rightarrow y = 6$ $AD = x + x + 4 = 12$ $BC = 3 + y = 9$	
۴	<p>فرض خلف: از A دو عمود بر d می توان رسم کرد.</p>  <p>$AB \perp d$</p> <p>$\{ \angle B + \angle C = 180^\circ$</p> <p>$AB \perp d$</p> <p>مجموع زوایا بیشتر از 180° می شود که این غیر ممکن است. پس به تناقض می رسیم. (خلاف فرض) پس حکم ثابت می در مثلث ABD شود.</p>	
۵	$f(x) = \frac{1}{3-x}$ <p>با توجه به شکل هر خط موازی محور x ها تابع را حداکثر در یک نقطه قطع می کند. پس تابع یک به یک است پس وارون پذیر است.</p> $y = \frac{1}{3-x} \rightarrow 3y - xy = 3 \rightarrow 3y - 3 = xy \rightarrow x = \frac{3y-3}{y} \rightarrow f^{-1}(x) = \frac{3x-3}{x}$	



جمهوری اسلامی ایران
وزارت آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
دبیرستان غیر دولتی موحّد

امتحانات
دبیرستان غیر دولتی موحّد

نام و نام خانوادگی :	نام دبیر : آقای غلامی
پایه : یازدهم ریاضی	تاریخ امتحان : 1400/2/27
کلاس :	زمان پاسخگویی : 80
	کلید ریاضی 2

الف)	$3f(1) - 3g(1) = 3(2) - 3(-3) = 6 + 9 = 17$	6
ب)	$D_{f \times g} = D_f \cap D_g = x \geq -3 \cap x \neq 2 = [-3, +\infty) - \{2\}$	
	$D_g = \left[-1, \frac{1}{2}\right]$ $R_g = [-2, 7]$	7
	$A = \sin(360 - 10) + \sin(90 + 10) - \cos(270 - 10) - \cos(180 + 10) = -\sin 10 + \cos 10 + \sin 10 + \cos 10 = 2 \cos 10 = 2(0/99) = 1/98$	8
		9
	$y = 4 \cos\left(2 \times \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}\right) = 4 \cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3}\right) = -2 \sin \frac{\pi}{3} = -2\sqrt{3}$	10
	$\log(x-3) + \frac{1}{2} \log 25 = 2$ $\log(x-3)5 = 2 \rightarrow 5x - 15 = 100 \rightarrow 5x = 115 \rightarrow x = 23$	11
الف)	$(0, +\infty) - R$ (ب) است - است	12
ت) یک	(ب) یک	
الف)	$5^{-6+2x} = 5^{12x-4} \rightarrow -6 + 2x = 12x - 4 \rightarrow x = \frac{-1}{5}$	13
ب)	$2^{-8} \leq 2^{12p-6} \rightarrow -8 \leq 12p - 6 \rightarrow p > \frac{-1}{6}$	
الف)	$D: x \geq 3$ ← در همسایگی چپ 3 تعریف نشده ← حد ندارد	14
ب)	$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 x \cos x}{1 - \sin x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(1 - \sin^2 x) \cos x}{1 - \sin x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (1 + \sin x) \cos x = 0$	
	$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ $f(1) = a + 2$ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x-2)} = -2$ $\rightarrow a + 2 = -2 \rightarrow a = -4$	15
	در بازه $(0, 1]$ پیوسته است. چون در یک پیوستگی چپ و در صفر پیوستگی راست دارد و در تمام نقاط میانی نیز پیوسته است. در بازه $[-1, 1]$ پیوسته نیست. چون در صفر پیوسته نیست.	16
	$B = \{(4, 5)(5, 4)(4, 6)(6, 4)(5, 5)(5, 6)(6, 5)(6, 6)\}$ مجموع بیشتر از 8 $A = \{(1, 1)(2, 2)(3, 3)(4, 4)(5, 5)(6, 6)\}$ دو عدد برابر	17
	$P(B A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{2}{36}}{\frac{1}{6}} = \frac{1}{9}$	



نام و نام خانوادگی :	نام دبیر : آقای غلامی	نام و نام خانوادگی :
پایه : یازدهم ریاضی	تاریخ امتحان : ۱۴۰۰/۲/۲۷	پایه : یازدهم ریاضی
کلاس :	زمان پاسخگویی : ۸۰	کلاس :

الف)	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.8 + 0.7 - 0.8 \times 0.7 = 0.94$	۱۸
ب)	$P(A - B) + P(B - A) = P(A \cap \bar{B}) + P(B \cap \bar{A}) = 0.8 \times 0.3 + 0.7 \times 0.2 = 3.8$	
تمام داده ها با هم برابرند	$5a - 5 = 10 \rightarrow a = 3$ $2b = 10 \rightarrow b = 5$ $\frac{c}{3} = 10 \rightarrow c = 30$ $\frac{3 + 5 + 30}{3} = \frac{38}{3}$	۱۹
الف)	$R = \max - \min = 250 - 12 = 238$	۲۰
ب)	$Q_1 = 43$	
ب)	$Q_2 = 80.5$	
ت)	$Q_3 = 100$	